

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Acerin ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

ACERIN

(*Acidum salicylicum* + *Acidum lacticum*)

(195 mg + 98 mg)/g

Płyn do stosowania na skórę

Skład:

1 g płynu do stosowania na skórę zawiera:

- substancje czynne: 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego;
- substancje pomocnicze: koloksylina, kalafonia, aceton, octan n-butyłu.

Dostępne opakowania:

Butelka zawierająca 8 g płynu.

Podmiot odpowiedzialny:

Scan-Anida Spółka z o.o.

ul. Motyla 26

30-733 Kraków

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Acerin i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Acerin
3. Jak stosować Acerin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Acerin
6. Inne informacje

1. Co to jest Acerin i w jakim celu się go stosuje

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne

- kwas salicylowy i kwas mlekowy.
- Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie. Kwas mlekowy jest środkiem złuszczącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Lek Acerin stosuje się do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry.

2. Zanim zastosuje się Acerin

Nie stosować leku Acerin:

- doustnie;
- w nadwrażliwości na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;
- u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;
- jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo;
- u dzieci
- na twarzy i w okolicy narządów płciowych.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Acerin

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry. Chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może spowodować oparzenia. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmięzioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu

salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą. Lek zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie „Ostrożnie z ogniem”.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono odpowiednich badań.

3. Jak stosować Acerin

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Namoczyć nogi w ciepłej wodzie przez 15-30 minut, a następnie po osuszeniu nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze lek Acerin. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry. Począć aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni. Następnie należy wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.

Dzieci

Nie stosować.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Acerin może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia niepokojących objawów, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Acerin

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchych pomieszczeniach.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem. Nie należy stosować leku Acerin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Scan-Anida Spółka z o.o.
ul. Motyla 26
30-733 Kraków

Data opracowania ulotki: 2007.10.11